

Załącznik nr 1 A. Wymagania i standardy jakościowe dla rzepaku będącego przedmiotem obrotu giełdowego w ramach RTRS

Do obrotu giełdowego w ramach RTRS kwalifikują się nasiona rzepaku wolne od GMO wyprodukowane na obszarze Unii Europejskiej, spełniające następujące wymagania jakościowe:

1. Nasiona rzepaku powinny być dojrzałe, czyste, zdrowe, o właściwym zapachu barwie i połysku.

2. Nasiona powinny być wolne od żywych szkodników (w tym roztoczy) niezależnie od ich stadium rozwoju.

3. Zawartość substancji niepożądanych w nasionach nie może przekraczać najwyższych dopuszczalnych poziomów określonych w:

ROZPORZĄDZENIU (WE) NR 396/2005 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (wraz z późniejszymi zmianami)

ROZPORZĄDZENIU KOMISJI (UE) NR 835/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 odnośnie do najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w środkach spożywczych

ROZPORZĄDZENIU (WE) NR 1829/2003 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy.

4. Poziom radioaktywności w ziarnie nie może przekraczać poziomu określonego w ROZPORZĄDZENIU RADY (Euratom) nr 2016/52 z dnia 15 stycznia 2016 r. określające maksymalne dozwolone poziomy skażenia promieniotwórczego żywności i pasz po awarii jądrowej lub w innym przypadku zdarzenia radiacyjnego oraz uchylające rozporządzenie (Euratom) nr 3954/87 oraz rozporządzenia Komisji (Euratom) nr 944/89 i (Euratom) nr 770/90

5. Produkcja nasion rzepaku powinny spełniać kryteria zrównoważonego rozwoju w rozumieniu Dyrektywy RED

6. Nasiona rzepaku powinny spełniać następujące parametry jakościowe:

Parametr jakościowy/ oznaczany wg norm	Jednostka	Klasa jakości A
A. Maksymalna wilgotność wg PN-EN ISO 665	%	9,0

B. Maksymalna zawartość zanieczyszczeń ogółem wg PN-EN ISO 658	%	2,0
C. Minimalna zawartość oleju wg PN-EN ISO 659	%	40,0
D. Maksymalna zawartość kwasu erukowego wg PN-EN ISO 12966-4	%	2,0

Normy opisujące metody badania wyróżników jakościowych ziarna żyta należy stosować zgodnie z aktualną wersją danej normy